

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

### 32 Solidago H

#### Zusammensetzung:

100 g (= 109,5 ml) Mischung enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Solidago virgaurea Ø	45,0 g
Pareira brava (HAB 1934) D3 Dil. (HAB 1, Vorschr. 4a)	15,0 g
Sabal serrulatum D1 Dil.	5,0 g
Populus tremuloides (HAB 1934) D2 Dil. (HAB 1, Vorschr. 3a)	5,0 g
Staphisagria D3 Dil.	5,0 g
Cantharis D4 Dil.	5,0 g
Borax D8 Dil.	5,0 g
Sonstige Bestandteile: Ethanol 15 % m/m.	

Dieses Präparat enthält 59,5 Vol.-% Alkohol.

Mischung, Originalpackungen zu 50 ml (N1) und 100 ml (N2).

Homöopathisches Mittel bei Erkrankungen der Harnorgane



NESTMANN Pharma GmbH  
Weierweg 17, D-96199 Zapfendorf/Bamberg,  
Tel. 09547/92210 Fax 09547/215

#### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich aus den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: Zur Durchspülung bei entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege sowie bei Harnsteinen und Nierengriß, ungenügende Diurese.

Hinweis:

Bei Blut im Urin oder akuter Harnverhaltung sollte ein Arzt aufgesucht werden.

#### Gegenanzeigen:

*Wann dürfen Sie 32 Solidago H nicht einnehmen?*

Wegen des Alkoholgehaltes soll 32 Solidago H bei Alkoholkranken nicht angewendet werden.

*Wann dürfen Sie 32 Solidago H erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?*

Wegen des Alkoholgehaltes soll 32 Solidago H bei Leberkranken, Epileptikern und Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen und aufgrund des Alkoholgehaltes sollte 32 Solidago H in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält 59,5 Vol.-% Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 2,1 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,5 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Hirnkranken oder Hirngeschädigten sowie für Schwangere und Kinder. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

#### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

In der Homöopathie ist bekannt, daß die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden kann.

Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, holen Sie medizinischen Rat ein.

#### Dosierungsanleitung, Art der Anwendung:

*Wie oft und in welcher Menge sollten Sie 32 Solidago H einnehmen?*

Soweit nicht anders verordnet, bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich je 5-10 Tropfen sowie bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich je 5-10 Tropfen.

Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis.

Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr erhalten nicht mehr als die Hälfte der Erwachsenenendosis.,

Säuglinge bis zum 1. Lebensjahr erhalten nach Rücksprache mit dem Arzt nicht mehr als ein Drittel der Erwachsenenendosis.

*Wie und wann sollten Sie 32 Solidago H einnehmen?*

Die Einnahme erfolgt mit einem Teelöffel Wasser vor bzw. zwischen den Mahlzeiten.

*Wie lange sollten Sie 32 Solidago H anwenden?*

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

#### Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis:

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

#### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums soll das Präparat nicht mehr angewendet werden.

#### Stand der Information:

März 2001