

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

GEBRAUCHSINFORMATION

Laryngomedin® N

Wirkstoff: Hexamidin-diisethionat

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil

45,0 g Sprühlösung enthalten: Hexamidin-diisethionat 45,0 mg

Sonstige Bestandteile

Ethanol, Zuckersirup, Glycerol, Pfefferminzöl, gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 45 g Sprühlösung.

Stoff- oder Indikationsgruppe

Entzündungshemmendes Mittel (Antiseptikum).

Pharmazeutischer Unternehmer

Artegodan GmbH
Wendlandstraße 1
29439 Lüchow
Telefon: 05841 / 939-0
Telefax: 05841 / 939-200

Hersteller

A. Nattermann & Cie. GmbH
Nattermannallee 1
D-50829 Köln
Tel.: (0221) 509-01
Fax: (0221) 509-2711

Anwendungsgebiete

Laryngomedin N wird angewendet bei allen entzündlichen Erkrankungen in Mund- und Rachenraum: Angina (Mandelenzündung), Entzündungen der Rachen- und Mundschleimhaut, der Zunge und des Zahnfleisches, Vor- und Nachbehandlung bei Mandeloperationen.

Hinweis:

Die Angina tonsillaris (Mandelenzündung), die durch Streptokokken (bestimmte Bakterienart) verursacht ist, bedarf einer systemischen Antibiotikatherapie. Laryngomedin N darf dabei nur zur lokalen Zusatzbehandlung eingesetzt werden.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Laryngomedin N nicht anwenden?

Laryngomedin N darf nicht angewendet werden bei bekannter Kontaktallergie gegen Hexamidin oder verwandte Amidine sowie gegen einen der weiteren Inhaltsstoffe des Präparates.

Laryngomedin N soll bei Säuglingen und Kindern unter drei Jahren nicht angewendet werden, es sei denn, der Arzt hat es ausdrücklich gestattet.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Enthält 1,0 Vol.-% Alkohol.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Bisher keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Laryngomedin N nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Laryngomedin N sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel von Laryngomedin N und wie oft sollten Sie Laryngomedin N anwenden?

Soweit nicht anders verordnet mehrmals täglich Mund- und Rachenraum mit 1 bis 2 Hüben aussprühen.

Wie sollten Sie Laryngomedin N anwenden?

Laryngomedin N wird in einer Flasche geliefert, der eine Pumpvorrichtung mit Rachenadapter beiliegt.

Pumpe und Rachenadapter gemäß Gebrauchsinformation montieren.

Zur Anwendung Sprührohr in den Mund einführen, Kopf des Sprührohres für 1 bis 2 Hübe herunterdrücken.

Während des Sprühens den Atem anhalten, einige Male schlucken, um eine optimale Benetzung der Schleimhaut des Rachenraumes zu erzielen.

Wie lange sollten Sie Laryngomedin N anwenden?

Bitte halten Sie sich bezüglich der Anwendungsdauer an die Anweisungen Ihres Arztes.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was ist zu tun, wenn Laryngomedin N in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Für Laryngomedin N sind keine Überdosierungs- oder Vergiftungserscheinungen bekannt.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Laryngomedin N angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?

Wenn Sie einmal eine Anwendung vergessen haben, so holen Sie diese so bald wie möglich nach.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Laryngomedin N auftreten?

Allergische Reaktionen der Mund- und Rachenschleimhaut sind möglich.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit und zur Aufbewahrung des Arzneimittels

Das Verfalldatum des Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie die Lösung nach diesem Datum nicht mehr.

Wie ist Laryngomedin N aufzubewahren?

Laryngomedin N sollte bei Raumtemperatur aufbewahrt werden


Stand der Information

Mai 2003

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!




Schraubkappen-
verschluss auf-
schrauben.
Flasche öffnen.




Pumpvorrichtung
in die Flasche ein-
führen.




Flasche fest ver-
schließen.



Rachenadapter auf
freiliegendes Teil
der Pumpvorrich-
tung aufsetzen, an-
drücken und nicht
verkanten.




Bei Gebrauch
Flasche stets
aufrecht halten.



Falsch !

**Vor der ersten Benutzung
mehrmals (3 bis 4 mal)
kräftig auf die Pumpe bis
zum Anschlag drücken, bis
ein nahezu gleichmäßiger
Sprühnebel austritt.
Danach ist die Pumpe
ständig funktionsfähig.**



Sprührohr in den Mund
einführen. Kopf des
Sprührohres für 1 bis 2
Hübe herunterdrücken.
Während des Sprühens
den Atem anhalten,
einige Male schlucken,
um eine maximale
Benetzung des
Rachenraumes zu
erzielen.

Bei evtl. Verstopfung des Sprührohres dieses einige Minuten in warmes Wasser legen und durchschwenken.
Die Füllmenge ist technisch bedingt.